

平成21年12月22日

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年2月3日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20065号	ブラシンジョーカーフロアブル	シラフルオフェン・フェリムゾン ・フサライド水和剤	住友化学株式会社
第20066号	ホクコーブラシンジョーカーフロアブル	シラフルオフェン・フェリムゾン ・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところ）】

- ・作物名「稲」の使用法「空中散布」を削除する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類	300倍	25ℓ/10a	収穫21日 前まで	2回以内	散布
	ツマグロヨコバイ カメムシ類	8倍	800ml/10a			空中散布
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	30倍	3ℓ/10a			無人ヘリコプター による散布
	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 変色米 (アルタナリア菌) 変色米 (エピコッカム菌) 変色米 (カーブラリア菌) コブノメイガ ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	8倍	800ml/10a			散布
		1000倍	60~150 ℓ/10a			

シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【 変更後 】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	300倍	25 ℓ /10a	収穫21日 前まで	2回以内	散布
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8倍	800 ml /10a			無人ヘリコプター による散布
	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 変色米 (アルタナリア菌) 変色米 (エピコッカム菌) 変色米 (カーブラリア菌) コブノメイガ ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	1000倍	60~150 ℓ /10a			散布

シラフルフェンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサイト®を含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)

【 変更理由 】

登録維持のために必要な資料整備に時間と経費を要するため。

平成21年12月22日

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年2月3日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20155号	ホクコーラブサイドジョーカーフロアブル	シラフルオフェン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・作物名「稲」の使用方法「空中散布」を削除する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類 イナゴ類	原液	200 mℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	空中散布	2回以内	6回以内 (穂ばらみ期 以降は 4回以内)
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	4倍	800 mℓ /10a			無人ヘリコ プターによ る散布		

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフェンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	4倍	800 mℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	無人ヘリコ プターによ る散布	2回以内	6回以内 (穂ばらみ期 以降は 4回以内)

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間と経費を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成22年2月3日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21739号	ホクコーラブモンガードジョーカーフロアブル	シラフルオフエン・ジクロメジン・フサライド水和剤	北興化学工業株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分）】

- ・作物名「稲」の使用方法「空中散布」を削除する。

【適用表】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフエンを含む農薬の総使用回数	ジクロメジンを含む農薬の総使用回数	フサライド [®] を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 カメムシ類 ツマグロヨコバイ ウンカ類	8倍	0.8 ℓ/10a	収穫 14日前 まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	2回以内	3回以内	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
	いもち病 カメムシ類 紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	30倍	3 ℓ/10a			空中散布			
	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	1000倍	60~150 ℓ/10a			散布			

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフエンを含む農薬の総使用回数	ジクロメジンを含む農薬の総使用回数	フサライド [®] を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 カメムシ類 ツマグロヨコバイ ウンカ類	8倍	0.8 ℓ/10a	収穫 14日前 まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	2回以内	3回以内	6回以内 (穂ばらみ期以降は4回以内)
	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	1000倍	60~150 ℓ/10a			散布			

【変更理由】

登録維持のために必要な資料整備に時間と経費を要するため。